

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МАСТИТА

Мастит – серьезная проблема для современных животноводческих комплексов. По данным Международной молочной федерации, а также результатов научных исследований, маститом может переболеть до 25–30% коров молочного поголовья.



Эта проблема наносит огромный ущерб хозяйству. Так, по данным ряда источников, количество коров, которые выбраковываются в результате хронизации мастита и, как следствие, атрофии долей вымени, составляет от 5 до 35% от общего числа выбракованных животных в хозяйствах, а молочная продуктивность животных, переболевших маститом, снижается на 7–32%.

Антибактериальные препараты остаются основными средствами лечения мастита. Ни для кого не секрет, что антибиотики проникают почти во все ткани и органы, в том числе и в молоко. В период лечения антибиотиками молоко не допускается в переработку и должно быть утилизировано. Кроме того, у любого антибиотика существует период ожидания, то есть период от последнего введения препарата до того момента, когда его остаточные количества не обнаруживаются в молоке либо соответствуют максимально допустимым уровням, разрешенным законодательством. Если период ожидания после применения препарата составляет 3–5 дней, то можно посчитать, сколько денег недополучает хозяйство, применяя такие лекарства.

Для эффективного решения проблемы маститов компания «Новая Группа» предлагает «Марбофлоцин 10%» – современный антибактериальный препарат на основе марбофлоксацина, фторхинолона последнего поколения, разработанный специально для ветеринарии, с широким спектром действия и периодом ожидания по молоку всего 24 часа.

Преимущества «Марбофлоцина 10%»:

- широкий спектр бактерицидного действия, действует на всех основных возбудителей мастита;
- уникальный механизм действия, основанный на подавлении бактериальных ферментов ДНК-гиразы

и топоизомеразы IV, участвующих в репликации ДНК микроорганизмов, что позволяет преодолевать резистентность к ранее используемым антибиотикам;

– период ожидания по молоку – 24 часа.

«Марбофлоцин 10%» технологичен, вводится подкожно, внутримышечно, один раз в сутки в дозе для крупного скота 1 мл препарата на 50 кг массы животного, при этом продолжительность курса лечения составляет от 3 до 5 дней. Также возможно однократное применение «Марбофлоцина 10%» крупному рогатому скоту внутримышечно в дозе 2 мл препарата на 25 кг массы животного.

Экспериментально доказано и подтверждено практикой, что терапевтическая эффективность «Марбофлоцина 10%» при лечении первично диагностированных клинических маститов значительно превосходит терапевтическую эффективность большинства схем, на сегодняшний день используемых в хозяйствах. При этом молоко от коров, пролеченных препаратом «Марбофлоцин 10%», можно использовать в пищевых целях уже через 24 часа после последнего введения препарата.

«Марбофлоцин 10%» – препарат выбора для современного ветеринарного врача.

Контактная информация

Тел.: +7 (495) 221-01-19,
info@groupnew.ru

Адрес: Московская область, г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13
<https://groupnew.ru/>